

Comment limiter les risques d'infections

A) Je souligne les règles d'hygiène de ma vie quotidienne

- Je me lave les mains avant de passer à table
- Je change mes chaussettes et mon slip une fois par semaine
- Je me brosse les dents après chaque repas
- Je prends une douche une fois par semaine
- Je bois au goulot de la bouteille familiale
- Je me lave les mains après être allé aux toilettes
- J'utilise le même verre qu'un camarade utilise déjà

B) Je remets dans un ordre chronologique les étapes de traitement d'une plaie

a) ...Je place un pansement stérile sur la plaie

b)... Je me lave les mains soigneusement à l'eau et au savon

c)... Je désinfecte la plaie avec un produit antiseptique (qui tue les micro-organismes)

d)... Je nettoie la plaie à l'eau du robinet et au savon afin d'éliminer les salissures (cailloux, poussières...) et les microbes.

C) Dans un hôpital, comment le personnel limite-t-il le risque de contamination ?

D) Je réfléchis sur la limitation de l'épidémie de SIDA : en utilisant les données du tableau, indique pourquoi le taux de contamination est-il plus important dans certains pays par rapport à d'autres ?

| Pays | Taux d'adultes contaminés par le virus du SIDA en 2000 | Nombre de préservatifs disponibles par habitant et par an |
|-----------------|--|---|
| Allemagne | 0,10 % | 2,1 |
| France | 0,44 % | 1,8 |
| Grande Bretagne | 0,11 % | 2,7 |
| Japon | 0,02 % | 29,0 |
| Rwanda | 11,20 % | 0,1 |