

Comment limiter les risques d'infections

A) Je souligne les règles d'hygiène de ma vie quotidienne

- Je me lave les mains avant de passer à table
- Je change mes chaussettes et mon slip une fois par semaine
- Je me brosse les dents après chaque repas
- Je prends une douche une fois par semaine
- Je bois au goulot de la bouteille familiale
- Je me lave les mains après être allé aux toilettes
- J'utilise le même verre qu'un camarade utilise déjà

B) Je remets dans un ordre chronologique les étapes de traitement d'une plaie

- a) ...Je place un pansement stérile sur la plaie
- b)... Je me lave les mains soigneusement à l'eau et au savon
- c)... Je désinfecte la plaie avec un produit antiseptique (qui tue les micro-organismes)
- d)... Je nettoie la plaie à l'eau du robinet et au savon afin d'éliminer les salissures (cailloux, poussières...) et les microbes.

C) Dans un hôpital, comment le personnel limite-t-il le risque de contamination ?

D) Je réfléchis sur la limitation de l'épidémie de SIDA : en utilisant les données du tableau, indique pourquoi le taux de contamination est-il plus important dans certains pays par rapport à d'autres ?

Pays	Taux d'adultes contaminés par le virus du SIDA en 2000	Nombre de préservatifs disponibles par habitant et par an
Allemagne	0,10 %	2,1
France	0,44 %	1,8
Grande Bretagne	0,11 %	2,7
Japon	0,02 %	29,0
Rwanda	11,20 %	0,1